

外展隊將助市民下載「港康碼」

薛永恒：通關時間待中央決定



【香港商報訊】記者唐信恒報道：

本港新冠肺炎疫情持續平穩。香港健康碼(「港康碼」)截至昨日約60.2萬人申請帳戶，當中有逾35.6萬人已啟動帳戶。創新及科技局局長薛永恒表示，申請人須上載最少21日「安心出行」紀錄，只要過境人士不屬於高風險就不會將紀錄轉交內地，並將有外展隊，於港鐵站為最有可能對下載「港康碼」有困難的香港市民提供協助，希望令「港康碼」落地更順暢。



為了防範變異病毒株，專家建議元旦後擴展「疫苗氣泡」範圍。 中通社

嚴謹措施減機組人員風險

薛永恒提到，內地防疫專家上月來港視察後已確認香港具備通關條件，而具體通關時間有待中央決定，特區政府會全力以赴與中央部委和廣東省衛健委等做好通關前期配套。至於手持「港康碼」市民於正式通關時可在政府網頁轉換成「粵康碼」，由於通關安排是粵港對等，故市民北上和南下時都要轉換健康碼。

食物及衛生局局長陳肇始表示，Omicron變異病毒株在很多地方爆發，香港必須嚴陣以待，在「內防擴散」和「外防輸入」兩方面繼續嚴謹處理，例如在機場採取閉環式管理，甚至在檢疫中心內有多次檢測，而「加強監測A組地區」入境人士首7日更要在檢疫中心每日做測試，目的是希望能及早發現與堵截個案進入社區。

因有研究顯示接種加強劑對Omicron的保護是有效，陳肇始呼籲市民需要盡快接種第3針疫苗。她續稱，有感染個案涉及一些貨機本地機組人員，而運輸及房屋局和航空公司是不斷商討一些嚴謹措施令這些機組人員可把有機會帶來的風險減到最低，局方更與航空公司一直聯繫並調查整體情況，務求不要再有類似個案發生。

專家指須打第3劑疫苗防爆發

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種2劑甚至3劑新冠肺炎疫苗以應對Omicron變異病毒株爆發是必須，建議政府最快元旦過後把「疫苗氣泡」擴展至所有食肆等。鑒於機組人員都要外出檢測、肚餓要買食物而與社區有些接觸，許樹昌建議衛生署考慮趁機組人員在家檢疫時上門收集檢測樣本。

疫情方面，本港昨日新增8宗輸入個案，6宗帶N501Y及1宗帶L452R變種病毒株，5男3女患者年齡介乎20至62歲，分別來自法國、意大利、英國、瑞士、西班牙、印度和肯尼亞，至今累計有12526宗確診個案。

此外，當局公布按全球最新新冠肺炎疫情發展，將於12月22日凌晨零時起指明巴勒斯坦和烏克蘭為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

另一方面，澳門氣象局昨日公布，預料「雷伊」會逐漸轉向偏北方向移動，約於今日清晨進入澳門800公里範圍，氣象局屆時將發出1號風球。雖然「雷伊」強度會有所減弱，但由於路徑較預期更接近澳門，與其相關的雲雨帶亦將於20至21日影響澳門，雨勢會較頻密及持續時間較長，風力間中達6級及有陣風。

天文台今定會否發熱帶氣旋警告

【香港商報訊】記者萬家成報道：天文台在昨日中午過後發出「特別天氣提示」，預測目前仍維持超強颱風強度的熱帶氣旋「雷伊」今日會進入本港800公里範圍內，至周二「冬至」會進入香港以南200公里範圍內，將視乎其強度及路徑變化，會在今日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

天文台表示，香港昨日繼續受東北季候風影響，而位於南海的「雷伊」會採取偏北方向移動，橫過南海中部並逐漸減弱，在今日(20日)進入本港800公里範圍內，逐漸靠近廣東沿岸。而與「雷伊」相關的雨帶會在未來兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。

「雷伊」冬至進港200公里

按照天文台預測路徑，「雷伊」會在今日下午進入香港西南面約600公里，強度減弱至強烈熱帶風暴，中心風力仍然達到時速110公里。其後繼續北上並轉向東北方向移動，周二下午進入香港以南200公里內，並且進一步減弱，強度只有熱帶低氣壓，中心風力只有時速55公里。之後「雷伊」會向東遠離，並在周三在香港東南面約400公里內減弱為低壓區。

另一方面，澳門氣象局昨日公布，預料「雷伊」會逐漸轉向偏北方向移動，約於今日清晨進入澳門800公里範圍，氣象局屆時將發出1號風球。雖然「雷伊」強度會有所減弱，但由於路徑較預期更接近澳門，與其相關的雲雨帶亦將於20至21日影響澳門，雨勢會較頻密及持續時間較長，風力間中達6級及有陣風。

兩岸四地論壇交流防控結核病

【香港商報訊】記者周偉立報道：衛生署昨日參與由中國防務協會統籌以視像形式舉辦的海峽兩岸暨港澳重大呼吸道傳染病防控合作論壇，就結核病防控的策略進行學術交流。

林文健冀完善合作基礎

昨日的論壇聚集北京、上海、福建省、廣東省、香港、澳門和珠海等地結核病的衛生及醫療單位的專家。衛生署署長林文健出席論壇開幕環節，就結核病的防控策略、治療方式及香港結核病概況致辭。林文健期望各方透過是次論壇，能在防控結核病和新冠肺炎疫情的雙重挑戰下，作出深入的研討交流，共享科研成果和信息數據，並進一步鞏固及完善合作基礎。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的微粒便會於空氣中散播，若旁人吸入這些微粒便有可能會受到感染。惟一般而言，與病人長時間接觸才是有效傳染的最重要條件。

市民須繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒，並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，便應注重呼吸道衛生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。



衛生署署長林文健(前排左三)與出席論壇的香港與會者合照。

熱烈慶祝

澳門回歸祖國二十二周年

澳門博彩控股有限公司

致意



澳門博彩控股有限公司
SJM HOLDINGS LIMITED